

Descripción general

Los pacientes con microgenia o un mentón reducido, pueden someterse a una mentoplastia de aumento. En la consulta previa, el cirujano plástico realizará un estudio de la estructura facial donde considerará los distintos elementos del rostro del paciente como la nariz, los labios y el mentón para que establecer los cambios que deberá realizar para que éstos guarden una armonía y proporción entre ellos.

Este procedimiento se puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas:

Mediante la inserción de prótesis de silicona o gorotex: en los casos en que se requiera un aumento leve o moderado. El cirujano plástico realizará una incisión dentro de la boca, entre la encía y el labio inferior (intraoral) o con una pequeña incisión debajo del mentón (submental).

Por qué se realiza

Para conseguir armonizar la cara

Puede ir sola o en combinación con rinoplastia, Lifting cervical, liposucción de papada...

Riesgos

- Infección y sangrado
- Edema
- Hematoma
- Migración del implante

Antes del procedimiento

La mentoplastia aislada se suele realizar de forma **ambulatoria**, aunque en ocasiones es preciso **estar una noche ingresado**.

Después del procedimiento

Tras el implante debe mantenerse una cuidada desinfección de la zona, especialmente si el implante se ha hecho por vía endobucal. El edema puede persistir algún tiempo, pudiendo mejorarse mediante masaje de drenaje linfático. Es probable que tu médico te sugiera tomar las siguientes medidas después de la cirugía:

- Utiliza **compresas de hielo durante 10 minutos** cada hora la noche posterior a la cirugía.
- **Limpia cuidadosamente** la boca con enjuagues con clorhexidina y no comas nada durante media hora después del colutorio



DRA. CARMEN IGLESIAS
CIRUGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA

- **Evita hacer esfuerzos**, levantar objetos pesados y nadar por una semana.
- **Evita las actividades extenuantes**, como los ejercicios aeróbicos y trotar, por una semana.
- Evita fumar.
- **Duerme con la cabeza elevada** por encima del nivel del pecho por algunos días.
- Aplica compresas frías para reducir la hinchazón.
- Por aproximadamente una semana, **evita tomar aspirina, ibuprofeno**, naproxeno y cualquier otro medicamento o suplemento de hierbas que pueda incrementar el sangrado. De ser necesario, toma **paracetamol** para reducir el dolor.

Busca atención médica de inmediato si tienes cualquiera de los siguientes síntomas:

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Frecuencia cardíaca inusual
- Dolor grave
- Sangrado

Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros

Dra. Carmen Iglesias
Cirugía Plástica
Nº Colegiado: 28-48-09159